



**Ciencia Latina**  
Internacional

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.  
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), septiembre-octubre 2024,  
Volumen 8, Número 5.

[https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v8i5](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5)

## **ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL DE LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA QUE CURSARON CON EMBARAZO ADOLESCENTE**

**SOCIAL STIGMATIZATION OF NURSING SCHOOL STUDENTS  
WHO STUDIED WITH TEENAGE PREGNANCY**

**María Magdalena Carbajal Mondragón**

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México

**Alma Rosa Picazo Carranza**

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México

**Graciela González Villegas**

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México

**Ma. Lilia Alicia Alcántar Zavala**

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México

**Josefina Negrete Ruiz**

**Hospital de la Mujer SSM, México**

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, México

DOI: [https://doi.org/10.37811/cl\\_rem.v8i5.13833](https://doi.org/10.37811/cl_rem.v8i5.13833)

## Estigmatización Social de las Estudiantes de la Facultad de Enfermería que Cursaron con Embarazo Adolescente

**María Magdalena Carbajal Mondragón**<sup>1</sup>

[1647542c@umich.mx](mailto:1647542c@umich.mx)

<https://orcid.org/0009-0003-5212-6123>

Universidad Michoacana  
de San Nicolas de Hidalgo  
Morelia – México

**Alma Rosa Picazo Carranza**

[alma.picazo@umich.mx](mailto:alma.picazo@umich.mx)

<https://orcid.org/0000-0001-9954-0792>

Universidad Michoacana  
de San Nicolas de Hidalgo  
Hospital de la Mujer SSM  
Morelia – México

**Graciela González Villegas**

[graciela.gonzalez@umich.mx](mailto:graciela.gonzalez@umich.mx)

<https://orcid.org/0000-0001-7764-2245>

Universidad Michoacana  
de San Nicolas de Hidalgo  
Morelia – México

**Ma. Lilia Alicia Alcántar Zavala**

[lilia.alcantar@umich.mx](mailto:lilia.alcantar@umich.mx)

<https://orcid.org/0000-0003-1528-3077>

Universidad Michoacana  
de San Nicolas de Hidalgo  
Morelia – México

**Josefina Negrete Ruiz**

[jozephinnegrete@gmail.com](mailto:jozephinnegrete@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0005-0155-9919>

Hospital de la Mujer SSM  
Morelia – México

**Andrea Portillo Esquivel**

[andrea.portillo@umich.mx](mailto:andrea.portillo@umich.mx)

<https://orcid.org/0009-0006-6111-9162>

Universidad Michoacana  
de San Nicolas de Hidalgo  
Hospital de la Mujer SSM  
Morelia – México

### RESUMEN

Introducción. El embarazo adolescente es un problema de salud que pone en riesgo tanto la vida de la madre como del hijo ya que durante esta etapa las mujeres pueden presentar múltiples complicaciones como endometritis puerperal y eclampsia. Según la organización mundial de la salud es considera el embarazo adolescente a la mujer de los 10 años hasta los 19 años. Objetivo. Identificar el estigma social de las estudiantes de la facultad de enfermería que cursaron con embarazo adolescente. Metodología. Estudio cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo y transversal, se utilizó el instrumento que evaluó la estigmatización de las adolescentes construido por la escala tipo Likert, donde la muestra fue 44 estudiantes de la Facultad de Enfermería que cumplieron los criterios de evaluación. Resultados. se observa que el 40% de las encuestadas fueron de un rango de edad de 19 años, el 32.5% vive en unión libre, el 35% de las encuestadas fue de séptimo semestre; en cuanto al nivel de estigmatización el 72% de las estudiantes presentaron algún tipo de estigmatización social durante el embarazo. Conclusiones. Es importante que el personal de salud realice intervenciones educativas para disminuir el embarazo adolescente y así mismo la implementación periódica para el seguimiento de las adolescentes que presentan embarazo adolescente.

**Palabras clave:** embarazo, adolescente, estigmatización social, estudiantes

---

<sup>1</sup> Autor principal.

Correspondencia: [1647542c@umich.mx](mailto:1647542c@umich.mx)

# Social Stigmatization of Nursing School Students who Studied with Teenage Pregnancy

## ABSTRACT

Introduction: teenage pregnancy is a health problem that puts the life of both the mother and the child at risk since during this stage women can present multiple complications such as puerperal endometritis and eclampsia. According to the World Health Organization, teenage pregnancy is considered to be a woman between the ages of 10 and 19. Objective: to identify the social stigma of nursing school students who studied with teenage pregnancy. Methodology: Quantitative study, non-experimental, descriptive and transversal design, the instrument that evaluated the stigmatization of adolescents constructed by the Likert- Type scale was used, where the sample was 44 students from the Faculty of Nursing who met the evaluation criteria. Results: it is observed that 40% of the respondents were in the age range of 19 years, 32.5% lived in a common law union, 35% of the respondents were in the seventh semester; Regarding the level of stigmatization, 72% of the students presented some type of social stigmatization during pregnancy. Conclusions: it is important that health personnel carry out educational interventions to reduce adolescent pregnancy and also the periodic implementation for the follow-up of adolescents who present adolescent pregnancy.

**Keywords:** teenage pregnancy, social stigmatization, students

*Artículo recibido 09 septiembre 2024  
Aceptado para publicación: 15 octubre 2024*



## INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de salud pública el embarazo adolescente se estima un problema significativo que pone en riesgo la vida tanto de la madre como del producto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el embarazo adolescente en mujeres a partir de los 10 años hasta los 19 años las cuales tienen un mayor riesgo de sufrir una endometritis puerperal, eclampsia e infecciones sistémicas que una mujer de 20 a 24 años, en cuanto a los bebés tienden a ser prematuros, de bajo peso y pueden presentar infecciones neonatales. (Gamarra, 2022)

Cada año, en regiones de desarrollo quedan embarazadas 21 millones de mujeres entre 15 y 19 años de las cuales 12 millones de ellas dan a luz. La tasa de nacimientos ha disminuido de 64,5 nacimientos por cada 1000 mujeres en el año 2000 a 41,3 nacimientos por cada 1000 mujeres en 2023. Aunque se han producido disminuciones en todas las regiones, África Subsahariana, América Latina y el Caribe continúan teniendo la tasa más alta a nivel mundial con 97,9 y 51,4 nacimientos por cada 1000 mujeres, respectivamente en 2023. (OMS, 2024)

A nivel mundial en el año 2023, se estima que la tasa de natalidad en adolescentes de 10 a 14 años fue de 1,5 por cada 1000 mujeres. (OMS, 2024)

Según la UNAM, México se coloca en el primer lugar en embarazos adolescentes a nivel mundial, entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. (INSP, 2023).

En Michoacán se registraron 437,009 adolescentes entre 15 y 19 años, que representan el 9.51% del total de la población (Loa, 2019).

La mortalidad materna calculada fue de 23.8 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, y en la primera semana de abril se registraron 138 defunciones, mientras que en el año 2022 se registraron 206 defunciones. (Montoya, 2023)

Se considera que las principales causas de muerte en las adolescentes, se presentan durante el periodo del embarazo y durante el parto en los países de desarrollo, a su vez conlleva a riesgos físicos, mentales y sociales, que disminuye las oportunidades educativas, salarios inadecuados y en ocasiones son propensas a sufrir violencia por parte de sus parejas, por ello es que son más vulnerables a una mayor dependencia. (INEGI, 2021)



Un embarazo a temprana edad es considerado indebido dentro de la sociedad, a consecuencia surge el aislamiento, a lo cual se le denomina “estigmatización”, “desprestigio”, se contempla como un factor de riesgo que amenaza a la dignidad de quienes lo vivencian. Las adolescentes tienen que lidiar con la economía, frustración, el sentimiento de abandono y muchas de ellas por parte de sus familias y parejas. (Chavarry-ysla, 2020).

Se examina como un fenómeno mundial ya que conlleva graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas tanto para las personas afectadas como sus familias y la comunidad. (OMS, 2024)

Las adolescentes son vistas de forma diferente por la sociedad y por su familia, ya que su cuerpo comienza a prepararse para la procreación de un nuevo ser humano, lo cual significa que tenga las condiciones aptas para asumirlo ante la sociedad. Desde el punto de vista del área de salud, enfermería tiene un papel importante durante el embarazo, parto y puerperio ya que es quien asesora para afianzar el autocuidado de la adolescente. (Colmenares, 2019)

La mayor incidencia de problemas perinatales se relaciona con la inmadurez biológica de la madre, embarazos no planeados, el desconocimiento del tema de salud reproductiva y sexualidad. Las principales causas de esta situación es la falta de educación sexual integral, poco acceso a los métodos anticonceptivos y las pocas oportunidades económicas. (Garnica,2019).

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) menciona que el 55% de los embarazos no deseados en las adolescentes de 15 a 19 años terminan en abortos, a su vez tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y el producto tiene mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, prematuridad y afecciones neonatales graves.

La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de América. En el año 2019 se registraron 695 muertes maternas en el país, las cuales 66 corresponden a menores de 20 años; entre las que se incluyen seis casos de niñas de 10 a 14 años. (inmujeres2021)

En un estudio realizado por Weimann revelo que 4 de cada 10 adolescentes refirieron haberse sentido estigmatizadas debido a su condición de embarazo. Se encontró además que las personas que lo vivencian tienen mayor probabilidad de presenta comorbilidades psicopatológicas, como aislamiento social, deseo de interacción bajo, abandono social, autoconcepto bajo, sentimiento de inseguridad y



sintomatología depresiva. (Chavarry-Ysla, 2020)

Las madres adolescentes tienen que lidiar muchas veces con su escasa economía, frustración y el sentimiento de abandono de algunas por parte de sus familias y parejas que las han llevado a asumir el rol prácticamente solas. Una de las consecuencias principalmente es el impacto psicológico que tienen que enfrentarlo solas. (Chavarry-Ysla, 2020)

Finalmente, la escasa madurez biológica y mental no solo afecta a la madre sino también al producto, y ocasiona graves secuelas para ambos. (Chavarry-Ysla, 2020)

Por lo ya mencionado se planteó el siguiente objetivo: Identificar el estigma social de las estudiantes de la facultad de enfermería que cursaron con embarazo adolescente.

## **METODOLOGÍA**

Estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal, no experimental, con una muestra no probabilística de 40 estudiantes que cursaron con embarazo adolescente.

Los criterios de inclusión fueron estudiantes de la facultad de enfermería que cursaron con un embarazo adolescente, que estuvieran inscritas, que quisieran participar en el estudio y firmaran el consentimiento informado y se excluyeron a las estudiantes que tuvieron aborto y que cursaron con embarazo después de los 20 años de edad y se eliminaron a los participantes que no contestaron completo el instrumento

Se elaboró el protocolo de investigación, en seguida se solicitó la evaluación de los Comités de Investigación y de Ética en la Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Se acudió con la secretaria académica de la Facultad para solicitarle la información de las secciones, se buscó a la población de estudio en un horario de 7:00 am a 13:00 horas y de 14:00 a 19:00 horas se les invitó a participar en el estudio a todas aquellas que cumplieran con los criterios de selección, se les informó en que consiste la participación y se les solicitó la firma del consentimiento informado.

Se solicitó que contestaran la cédula de datos sociodemográficos y el instrumento Escala de la Estigmatización de la Adolescente Embarazada. En seguida se les agradeció a las participantes por haber colaborado en el proyecto de investigación.



Para el procesamiento de los resultados se utilizó estadística descriptiva y estadística inferencial con el paquete estadístico SPSS versión 26.

Se utilizó el instrumento Escala de la Estigmatización de la Adolescente Embarazada (EEAE). La EEAE está constituida por 7 ítems que evaluaron cuán estigmatizadas (prejuiciadas, marginadas y/o discriminadas) se han sentido las adolescentes en el transcurso de su embarazo. Para la construcción teórica de nuestra EEAE se asumió dos entidades sociales promotoras de la estigmatización: la familia (en torno a la cual se plantearon tres ítems) y el entorno social (en torno a los cuales se plantearon cuatro ítems). Los siete ítems contaron con respuesta tipo Likert de cuatro opciones, según frecuencia. (Mori-Quispe, 2015).

Esta investigación se consideró sin riesgo, además que se apego a la ley general de salud en materia de investigación así como se respetaron los principios éticos y la NOM-012-SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación en seres humanos.

## RESULTADOS

Para dar respuesta al objetivo uno que fue caracterizar a la población de estudio de acuerdo con las variables sociodemográficas, mostrando que la edad promedio de embarazo adolescente fue e el 40% con 19 años, el 25% 18 años, así como el 17.5% con 17 años como se muestra en la tabla uno.

**Tabla 1.** Edad de las estudiantes de la facultad de enfermería que cursaron con embarazo adolescentes

Edad.	<i>f</i>	%
15	3	7.5
16	4	10.0
17	7	17.5
18	10	25.0
<b>19</b>	<b>16</b>	<b>40.0</b>
Total.	40	100

Nota: *f*= frecuencia, %= porcentaje.

El estado civil donde se presentó mayor frecuencia en las estudiantes adolescentes durante su embarazo fue: solteras con un 37.5% y en unión libre con un 32.5%.

**Tabla 2.** Estado civil de las estudiantes de la facultad durante el embarazo adolescentes.

<i>Estado civil</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Soltera	15	37.5
Casada	12	30.0
Unión libre	13	32.5
Total.	40	100

Nota: *f*= frecuencia, *%*= porcentaje

El semestre donde se presentaron más estudiantes embarazadas adolescentes fue en séptimo semestre con una frecuencia de 35% y en tercer semestre con 27.5% como se muestra en la tabla tres.

**Tabla 3.** Semestres encuestados a las estudiantes de la facultad de enfermería.

<i>Semestre</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Primer semestre	10	25.0
Tercer semestre	11	27.5
Quinto semestre	5	12.5
Séptimo semestre	14	35.0
Total.	40	100

Nota: *f*= frecuencia, *%*= porcentaje

En siguiente tabla cinco se puede observar de acuerdo al turno de clases las estudiantes que mas embarazos presentaron en la adolescencia fueron en el vespertino con 60% seguido del matutino con 40%.

**Tabla 5** Número de Embarazos presentados de acuerdo al turno de clases.

<i>Turno de clases</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Matutino	16	40.0
Vespertino	24	60.0
Total.	40	100

Nota: *f*= frecuencia, *%*= porcentaje

Para dar respuesta al objetivo general de la investigación que fue Identificar el estigma social de las estudiantes de la facultad de enfermería que cursaron con embarazo adolescente, se identificó que (n=40) 72.5%(29) de las adolescentes presentaron estigmatización, mientras que 27.5%(11) de ellas no sufrieron estigmatización social como se muestra en la tabla seis.

**Tabla 6.** Estigmatización social de las estudiantes que cursaron con embarazo adolescente

	<i>f</i>	%
Nunca	11	27.5
A veces	13	32.5
La mayoría de las veces	8	20.0
Siempre	8	20.0
TOTAL	40	100

Nota: *f*= frecuencia, %= porcentaje

## DISCUSIÓN

Chavarry-Ysla (2020), refiere en su investigación que la mayoría de las mujeres embarazadas el 42 % presentaron estigmatización, y el 53% afirmo que todo el tiempo percibieron miedo durante la gesta de su embarazo, estos resultados coinciden con los de esta investigación.

Garnica y colaboradores en el (2019) observó que el estado civil predomino con un 96,2% las mujeres solteras y en unión libre y la edad promedio fue de 12 años a 19 años con mayor prevalencia de embarazos a los 16 años, los resultados coinciden con esta investigación.

Chávarry-Ysla (2020) en su artículo Estigmatización del sistema adolescente embarazada refiere que en todas sus dimensiones presentaron estigmatización estos resultados coinciden con esta investigación.

## CONCLUSIONES

En conclusión, el embarazo adolescente es un problema de salud pública mundial, y es de suma importancia que el personal de salud realice intervenciones en el cuidado para disminuir el embarazo adolescente ya que conlleva consecuencias que ponen en riesgo la vida de la madre e hijo y a su vez eliminar el estigma social el cual también tiene repercusiones en la vida de las adolescentes que viven un embarazo a una edad temprana.

Con esta investigación se evidencio que las adolescentes son solteras lo que quiere decir que no tienen ese apoyo paternal hacia el hijo, en donde es de suma importancia para un buen y mejor desarrollo psicosocial tanto del hijo como de la madre; todo esto repercute a nivel psicológico lo que conlleva a un estado emocional bajo en muchas de las jóvenes.



Es importante que en las diversas instituciones gubernamentales realicen estrategias que apoyen a los estudiantes adolescentes embarazadas para que se puedan salir adelante en sus estudios y actividades que realicen así mismo realizar actividades para la prevención de embarazos a temprana edad y con esto se tenga una mejora en la economía de la familia, familias unidas para un buen desarrollo tanto de los recién nacidos como de la familia en conjunto.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). *Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud*.

[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg\\_LGS\\_MIS.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf)

Chávarry-Ysla, Patricia del Rocío. (2020). Estigmatización del sistema adolescente embarazada. *Revista Cubana de Enfermería*, 36(1), . Epub 01 de marzo de 2020. Recuperado en 15 de septiembre de 2024, de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03192020000100007&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192020000100007&lng=es&tlng=es).

Colmares,Z., Montero, L., Reina, R., Gonzalez, Z., (2019). Intervención de enfermería durante la clínica prenatal y conocimiento sobre riesgo fisiológico de la adolescente embarazada.

[https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1695-61412010000100005](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000100005)

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescentes (ENAPEA), (2021).

<https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454>

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), (2021). No niñas madres. <https://www.insp.mx/avisos/no-ninas-madres>

Gamarra, C. M., Pante, S. G., (2022). Embarazo en la adolescencia y los indicadores de salud materna y perinatal. *Revista urbana de ciencias médicas*. 21(2), p. 2.

[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1729-519X2022000200012&lang=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2022000200012&lang=es)

Garnica, G., Granjales, R. V., Montenegro, L.V., (2020). *Nivel de Estigmatización de la adolescente embarazada*. P, 11.

<https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/3924/1124863455.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



Grove, S. y Gray, J. (2019). Investigación en Enfermería. Desarrollo de la practica enfermera basada en la evidencia. Madrid: Elsevier.

INMUJERES (2021). *Madres adolescentes*. P, 2-3.

[http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres\\_adolescentes.pdf](http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes.pdf)

INEGI. (2021). Comunicado de prensa.

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP\\_EmbNoPlanificado23.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_EmbNoPlanificado23.pdf)

Loa, B., F., (2019). Embarazos no deseados entre las Mujeres Adolescentes en la Ciudad de Morelia, Michoacan. [http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/DGB\\_UMICH/1524/1/ININEE-M-2019-1161.pdf](http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/DGB_UMICH/1524/1/ININEE-M-2019-1161.pdf)

Martinez, E., Montero, G., Zambrano, R., (2020). El embarazo adolescente como un problema de salud pública en Latinoamérica. *Revista espacios*. P,2,

<https://www.revistaespacios.com/a20v41n47/a20v41n47p01.pdf>

Montoya, N. Y., (2023). *Muertes Maternas*.

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/819558/MM\\_2023\\_SE16.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/819558/MM_2023_SE16.pdf)

Mori-Quispe, E., Contreras-Pulache, H., Hinostroza, C. W., Lam-Figueroa, N., Huapaya- Huertas, O., Black-Tam, C., Urrutia-Aliano, D., (2015). Evaluación de un instrumento para cuantificar la estigmatización de la adolescente embarazada en Peru *Anales de la facultad de Medicina*.

[http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1025-55832015000300006](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000300006)

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 04 de enero del 2013. Disponible en: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5284148&fecha=04/01/2013#gsc.tab=0](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148&fecha=04/01/2013#gsc.tab=0)

Organización Mundial de la Salud (OMS), (2024). [https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/adolescentpregnancy#:~:text=Aunque%20se%20han%20producido%20disminuciones,%2C%20en%202023%20\(3\).](https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/adolescentpregnancy#:~:text=Aunque%20se%20han%20producido%20disminuciones,%2C%20en%202023%20(3).)

UNFPA. (2020). *Embarazo Adolescente*. <https://mexico.unfpa.org/es/topics/embarazo-en-adolescentes-0>

